


Product: **FLOGOREX EMULGEL**
 Internal code: **FT.CE.154**
 Country: **--**
 Company: **PJ PHARMA**
 Operator:



Product: FLOGOREX EMULGEL
Internal code: FT.CE.154
Country: --
Company: PJ PHARMA
Operator:

Flogorex Emulgel



Composizione:

Aqua, Menthol, Sodium chloride, Cetearyl alcohol, Ethylhexyl palmitate, Glyceryl stearate, PEG-100 stearate, Camphor, Eucalyptus globulus oil, Methyl salicylate, Glycerin, Simmondsia chinensis seed oil, Stearic acid, Phenoxyethanol, Triethanolamine, Polyacrylate crosspolymer-6, Tocopherol, Limonene, Disodium EDTA, Ethylhexylglycerin, Linalool.

Indicazioni terapeutiche:

FLOGOREX EMULGEL è un dispositivo medico indicato in caso di traumi localizzati e contusioni. Grazie all'azione osmotica ed ai suoi componenti volatili il prodotto è utile nel dare sollievo in caso di dolore muscolare o articolare.

Controindicazioni:

Non sussistono rischi di assuefazione e dipendenza. Trattandosi di un preparato per applicazione topiche, il suo uso deve essere esclusivamente esterno. Non utilizzare in caso di ipersensibilità nota verso i componenti del prodotto. L'uso, specie se prolungato, dei prodotti per uso topico può dare origine a fenomeni di sensibilizzazione.

Posologia e modo di somministrazione:

Applicare il prodotto 3-4 volte al giorno, sulle parti interessate con un leggero massaggio per favorire l'assorbimento. Dopo ogni applicazione lavarsi accuratamente le mani.

Conservazione:

Conservare a temperatura ambiente. Conservare la confezione ben chiusa e a riparo da fonti di calore. Il prodotto non va usato oltre 30 giorni successivi dalla sua apertura.

Avvertenze:

Il dispositivo non è soggetto a particolari precauzioni di utilizzo, si avverte, comunque:
 - Tenere fuori dalla portata dei bambini.
 - Non impiegare su lesioni aperte (ferite), mucose ed aree cutanee trattate con radiazioni.
 - Tenere lontano dagli occhi.
 - Non superare le dosi consigliate.
 - Non utilizzare il prodotto dopo la data di scadenza; la data di scadenza si riferisce al prodotto integro e correttamente conservato.
 - Non utilizzare il prodotto se la confezione non si presenta integra.
 - Dopo un breve periodo di trattamento (5 giorni) senza risultati apprezzabili consultare il medico.
 - In caso di reazione avversa sospendere l'uso del prodotto e consultare il medico al fine di istituire idonea terapia.
 - Il rispetto delle istruzioni contenute nel foglietto illustrativo riduce il rischio di effetti indesiderati. È importante segnalare al medico o al farmacista la comparsa di effetti indesiderati non descritti nel presente foglietto illustrativo.

Interazioni ed incompatibilità:

L'uso contemporaneo di altri preparati topici sulla stessa area di applicazione potrebbe causare il mancato assorbimento dei componenti, il peggioramento delle proprie condizioni o altri effetti collaterali non prevedibili.

Gravidanza e allattamento:

Gravidanza: non vi sono dati adeguati sull'uso del prodotto nelle donne in gravidanza, pertanto, in tal caso, deve essere usato solo dopo aver consultato il medico ed aver valutato con lui il rapporto rischio/beneficio nel proprio caso. È tuttavia opportuno evitare l'uso prolungato (massimo 3 giorni) del prodotto su aree cutanee estese durante la gravidanza.

Allattamento: è opportuno evitare l'uso del prodotto sul seno durante l'allattamento. Consultate il medico nel caso sospettiate uno stato di gravidanza o desideriate pianificare una maternità.

Presentazione:

Confezione contenente 1 tubo da 100 ml.

Gruppo Farmaimpresa srl
 Via Cipro, 1
 25124 Brescia



Il Dispositivo Medico non deve essere gettato nell'acqua di scarico o nei rifiuti domestici. Chieda al farmacista come eliminare i Dispositivi Medici che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

Flogorex Emulgel



Composition:

Aqua, Menthol, Sodium chloride, Cetearyl alcohol, Ethylhexyl palmitate, Glyceryl stearate, PEG-100 stearate, Camphor, Eucalyptus globulus oil, Methyl salicylate, Glycerin, Simmondsia chinensis seed oil, Stearic acid, Phenoxyethanol, Triethanolamine, Polyacrylate crosspolymer-6, Tocopherol, Limonene, Disodium EDTA, Ethylhexylglycerin, Linalool.

Therapeutic indications:

FLOGOREX EMULGEL is a medical device indicated in cases of local trauma and contusions. Thanks to the osmotic action and its volatile components, the product is useful in providing relief in case of muscle or joint pain.

Contraindications:

There are no risks of addiction and dependence. Being a preparation for topical applications, its use must be exclusively external. Do not use in case of known hypersensitivity to the components of the product. The use, especially if prolonged, of products for topical use may give rise to sensitization phenomena.

Posology and method of administration:

Apply the product 3-4 times a day, on the affected parts with a gentle massage to promote absorption. Wash hands thoroughly after each application.

Storage Conditions:

Store at room temperature. Keep the package tightly closed and away from heat sources. The product should not be used more than 30 days after opening.

Warnings:

The device is not subject to particular precautions of use, it is warned, however:
 - Keep out of reach of children.
 - Do not use on open lesions (wounds), mucous membranes and skin areas treated with radiation.
 - Keep away from eyes.
 - Do not exceed recommended doses.
 - Do not use the product after the expiry date; the expiry date refers to the undamaged and correctly stored product.
 - Do not use the product if the packaging is not intact.
 - After a short period of treatment (5 days) without any appreciable effect, consult your doctor.
 - In the event of an adverse reaction discontinue use of the product and consult your doctor for appropriate treatment.
 - Following the instructions in the package insert reduces the risk of undesirable effects. It is important to inform your doctor or pharmacist if you experience side effects that are not described in this package leaflet.

Interactions and incompatibilities:

The simultaneous use of other topical preparations on the same area of application could result in non-absorption of the components, worsening of your condition or other unforeseeable side effects.

Pregnancy and lactation:

Pregnancy: There are no adequate data on the use of the product in pregnant women, therefore, in that case, it should be used only after consulting the doctor and evaluating with him the risk/benefit ratio in your case. However, it is appropriate to avoid prolonged use (maximum 3 days) of the product on extended skin areas during pregnancy.
 Lactation: the use of the product on the breast should be avoided during lactation. Consult your doctor if you suspect a pregnancy or wish to plan a maternity.

Presentation:

Package containing 1 tube of 100 ml.

Gruppo Farmaimpresa srl
 Via Cipro, 1
 25124 Brescia



The medical device should be not disposed in the wastewaters or household waste. Ask your pharmacist how to dispose Medical Devices no longer required. This will help protect the environment.