



Product: **FLOGOREX**
 Internal code: **FT.IA.104**
 Country: **-**
 Company: **PJ PHARMA**
 Operator:





Product: FLOGOREX
Internal code: FT.IA.104
Country: -
Company: PJPHARMA
Operator:



Product: *FLOGOREX*
 Internal code: *FT.IA.104.F*
 Country: -
 Company: *PJPHARMA*
 Operator:

Flogorex

Integratore alimentare

Compresse

Per infiammazione o flogosi si intende l'insieme delle modificazioni che si verificano in un distretto dell'organismo colpito da un danno di intensità tale da non incidere sulla vitalità di tutte le cellule di quel distretto. Il danno può essere provocato da agenti fisici (traumi, calore), agenti chimici (acidi ecc.), agenti tossici e da agenti di natura biologica (batteri, virus ecc.). La risposta al danno è data dalle cellule che sono sopravvissute all'azione di esso. L'infiammazione è una reazione prevalentemente locale. I sintomi più importanti della flogosi (cardinali) sono il calor (aumento della temperatura locale dovuto all'aumentata vascolarizzazione), tumor (gonfiore determinato dalla formazione dell'essudato), rubor (arrossamento legato all'iperemia attiva), dolor (indolenzimento provocato dalla compressione e dall'intensa stimolazione delle terminazioni sensitive da parte dell'agente infiammatorio e dei componenti dell'essudato) e la functio laesa (compromissione funzionale della zona colpita).

Flogorex è un integratore alimentare a base di Bromelina e Boswellia. La Boswellia favorisce il contrasto di stati di tensione localizzati, utile nei casi di ridotto apporto con la dieta o di aumentato fabbisogno di tale nutriente.

Modalità d'uso: Si consiglia l'assunzione di 1-2 compresse al giorno.

Conservazione: Conservare a temperatura compresa tra 5°C e 25°C in un luogo asciutto (UR<50%). Evitare l'esposizione a fonti di calore localizzate ed ai raggi solari. Non conservare in luoghi umidi, come ad esempio cucine o bagni. Il termine minimo di conservazione si riferisce al prodotto correttamente conservato, in confezione integra. Conservare il prodotto nella confezione originale. Non riporre il prodotto nelle vicinanze di sostanze pericolose, come ammoniaca, benzina, acetone, sostanze che evaporano facilmente o infiammabili.

Avvertenze: Tenere fuori dalla portata dei bambini sotto i 3 anni di età al fine di evitare l'accidentale assunzione del prodotto. Non superare la dose giornaliera consigliata. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata, equilibrata e di uno stile di vita sano. Non utilizzare il prodotto se la confezione non si presenta integra. Si sconsiglia l'uso nei casi di ipersensibilità accertata verso uno o più ingredienti riportati. Data la natura degli ingredienti contenuti, il prodotto potrebbe presentare un aspetto diverso da lotto a lotto: ciò non inficia la qualità del prodotto. *Nei soggetti in trattamento con farmaci anticoagulanti/antiaggreganti piastrinici si consiglia di sentire il parere del proprio medico prima di assumere il prodotto.*



Realizzato da:
gi Gruppo Farma Impresa

ft.ia.104.f.07

Flogorex

Food supplement

Tablets

For inflammation or flogosis is considered the set of changes that occur in an organism district hit by a damage of an intensity that not affect the vitality of all cells of that district. The damage may be caused by physical agents (trauma, heat), chemicals (acids, etc.), toxic agents and by biological agents (bacteria, viruses etc.). The response to injury is given by cells that have survived to the action of it. Inflammation is a reaction mainly local. The most important symptoms of inflammation (cardinals) are the calor (local temperature increase due to increased vascularization), tumor (swelling determined by the formation of exudate), rubor (redness tied to the active hyperemia), dolor (soreness caused by compression and by intense stimulation of sensory endings of the inflammatory agent and by exudate components) and functio laesa (impaired function of the affected area).

Flogorex is a food supplement based on Bromelain and Boswellia. Boswellia promotes the contrast of localized tension states, useful in cases of reduced dietary intake or increased requirement of that nutrient.

How to use: It is recommended the intake of 1-2 tablets a day.

Storage conditions: Store in a dry place, temperature between 5°C and 25°C (RH<50%). Avoid exposure to localized heat sources and sunlight. Do not store in damp places, such as kitchens or bathrooms. The date of minimum durability refers to the product properly stored in unopened package. Store in the original package. Do not store the product in the vicinity of hazardous substances, such as ammonia, gasoline, acetone, or flammable substances that evaporate easily.

Warnings: Keep out of reach of children under 3 years of age to prevent the accidental intake of the product. Do not exceed the recommended daily dose. The supplements are not intended as a substitute for a varied and balanced diet and a healthy lifestyle. Do not use the product if the package does not show intact. It is not recommended for use in cases of known hypersensitivity to one or more ingredients listed. Given the nature of the ingredients, the product may look different from batch to batch: this does not affect the quality of the product. *In subjects treated with anticoagulants / antiplatelet is recommended to seek the advice of your doctor before taking the product.*



Realized by:
gi Gruppo Farma Impresa

ft.ia.104.f.07