

Product: ORALIA  
 Internal code: FT.CE.97  
 Country:  
 Company:  
 Operator:

Folded size:  
 Paper:  
 Colors:  
 Finishing:



Product: ORALIA  
 Internal code: FT.CE.97  
 Country:  
 Company:  
 Operator:

Size flat/folded:  
 Paper:  
 Colors:

# ORALIA



ORALIA spray orale è un dispositivo medico coadiuvante nell'igiene specifica del cavo orale e della gola. Utile negli stati di irritazione ed arrossamenti delle mucose gengivali ed orofaringee.

**Composizione:** Aqua, Xylitol, Polysorbate 20, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Sodium Chloride, Citric Acid, Potassium Sorbate, Chlorexidine Digluconate, Sucralose, Melaleuca Alternifolia Oil, Mentha Piperita Oil, Aroma, Bisabolol, Sodium Dehydroacetate, Aloe Barbadensis Gel, Sodium Hyaluronate, Sodium Ascorbyl Phosphate, Citrus Medica Limonum Oil.

**Dosaggio:** 1-2 spruzzi, 2-4 volte al giorno o più spesso al bisogno.

**Modalità d'uso:**

- 1) Spostare l'erogatore in posizione orizzontale e porre lo stesso in corrispondenza della sede di applicazione;
- 2) Premere la testa dell'erogatore al fine per far fuoriuscire una quantità predosata e nebulizzata di soluzione;
- 3) Dopo l'uso, sciacquare accuratamente l'erogatore.

**Avvertenze:** Tenere fuori dalla portata dei bambini. Conservare a temperatura compresa tra 5°C e 25°C al riparo da luce e da fonti di calore. Non utilizzare il prodotto dopo la data di scadenza. Non utilizzare il prodotto se la confezione non si presenta integra. La data di scadenza si riferisce al prodotto integro e correttamente conservato. Il prodotto in bambini al di sotto dei dodici anni di età va somministrato solo secondo prescrizione del medico o dell'odontoiatra. Evitare di spruzzare negli occhi. L'uso del flacone è personale; l'uso dello stesso flacone da parte di più soggetti, può facilitare la trasmissione di infezioni.

**Effetti collaterali:** In alcuni casi la nebulizzazione può causare un lieve e transitorio senso di irritazione locale. L'uso, specie se prolungato, può dar luogo a fenomeni di sensibilizzazione. Dove ciò si verifici, interrompere il trattamento al fine di istituire idonea terapia. Non somministrare in caso di ipersensibilità accertata verso uno o più componenti; in caso di reazioni indesiderate, sospendere il trattamento e consultare un medico. E' importante segnalare al proprio medico o farmacista la comparsa di effetti indesiderati non descritti nel presente foglietto illustrativo.

**Presentazione:** Soluzione in flacone di vetro da 20 ml con erogatore spray direzionale.



Il Dispositivo Medico non deve essere gettato nell'acqua di scarico o nei rifiuti domestici. Chiedi al farmacista come eliminare i Dispositivi Medici che non utilizzi più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.

FT.CE.97/00 Rev. del 29/04/2021

# ORALIA



ORALIA oral spray is an adjuvant medical device in the specific hygiene of the oral cavity and of the throat. Useful in the states of irritation and redness of gingival and oropharyngeal mucous membranes.

**Composition:** Aqua, Xylitol, Polysorbate 20, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Sodium Chloride, Citric Acid, Potassium Sorbate, Chlorexidine Digluconate, Sucralose, Melaleuca Alternifolia Oil, Mentha Piperita Oil, Aroma, Bisabolol, Sodium Dehydroacetate, Aloe Barbadensis Gel, Sodium Hyaluronate, Sodium Ascorbyl Phosphate, Citrus Medica Limonum Oil.

**Dosage:** 1-2 sprays, 2-4 times a day or more often as needed.

**How to use:**

- 1) Move the dispenser horizontally and place it at the location of application;
- 2) Press the head of the nozzle to release a predated and nebulized quantity of solution;
- 3) After use, rinse thoroughly the dispenser.

**Warnings:** Keep out of the reach of children. Store at a temperature between 5 C and 25 C shelter from light and heat sources. Do not use the product after the expiration date. Do not use the product if the package does not appear intact. The expiry date refers to the product intact and properly preserved. The product in children under twelve years of age should be administered only according to doctor's or dentist's prescription. Avoid spraying in the eyes. The use of the bottle is personal; the use of the same bottle by several subjects, can facilitate the transmission of infections.

**Side effects:** In some cases spraying may cause a mild and transient sense of irritation local. The use, especially if prolonged, may give rise to sensitization phenomena. Where this occurs, stop treatment in order to establish suitable therapy. Do not administer in case of hypersensitivity detected to one or more components; in case of adverse reactions, discontinue treatment and consult a doctor. It is important to report to your doctor or pharmacist the appearance of effects unwanted products not described in this package leaflet.

**Presentation:** Solution in 20 ml glass bottle with directional spray dispenser.



The medical device must not be thrown into the waste water or household waste. Ask your pharmacist how to dispose medical devices you don't need. This will help to protect the environment.

FT.CE.97/00 Rev. del 29/04/2021